



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Cofinanziato
dall'Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027—Intervento SRH06—“servizi di back office per l'AKIS”

GENOVA – bollettino n.20 del 24/09/2026

Bollettino Olivo

Centro di Agrometeorologia
Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE ATTUALE

Prosegue la maturazione delle drupe e un numero sempre maggiore di olive ha iniziato l'invaiaitura, soprattutto negli oliveti delle aree litoranee e di primo entroterra, dove la fase fenologica prevalente è la BBCH 81. Si osserva comunque un'ampia variabilità dello sviluppo fenologico, anche all'interno della stessa pianta. Nelle aree più elevate del primo entroterra e nelle zone di entroterra prevale ancora la fase di inizio maturazione (BBCH 80). Attenzione a non confondere la colorazione tipica della varietà con la **falsa invaiatura**, propria di olive con stato



fitosanitario compromesso, anche se incidenze significative di olive in tali condizioni risultano limitate e correlate a situazioni particolari, quali oliveti irrigati, con scarsa carica produttiva o con prevalenza di varietà più soggette agli attacchi della mosca.

A eccezione degli areali interessati dalla cascola causata da fenomeni meteo avversi, a poche settimane dall'apertura dei frantoi la **carica produttiva si conferma medio-buona e lo stato fitosanitario delle olive continua a risultare generalmente molto buono.**

Si consiglia di pianificare la raccolta delle olive in funzione dell'andamento delle infestazioni e del contenuto in olio delle olive, privilegiando la qualità rispetto alla quantità di prodotto.

Cessato lo STATO di GRAVE PERICOLOSITÀ INCENDI BOSCHIVI

Si raccomanda tuttavia di mantenere la massima attenzione nello svolgimento di attività che possano comportare l'innesco di incendi.

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756

e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it



www.facebook.com/agriligurianet



Telegram: CAARserviziBot



Autorità di Gestione CSR Liguria



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Cofinanziato
dall'Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA


Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027—Intervento SRH06—“servizi di back office per l'AKIS”

GENOVA – bollettino n.20 del 24/09/2026




ANDAMENTO METEO

Andamento temperature massime nelle stazioni meteo più calde delle diverse fasce



Le temperature massime hanno registrato un rialzo rispetto alla scorsa settimana, salvo diminuire nuovamente nella giornata di ieri. I valori massimi non sono oramai più tali da determinare mortalità delle forme larvali di mosca olearia.

Cumulato degli ultimi 7 giorni nelle stazioni delle diverse fasce con precipitazioni più elevate



Le precipitazioni degli ultimi 7 giorni sono caratterizzate da cumulati molto rilevanti in alcune stazioni. I grafici riportati a fianco evidenziano l'andamento settimanale delle temperature massime e dei cumulati di pioggia relativi alle stazioni meteo che hanno registrato i valori più elevati nelle diverse fasce provinciali.

Previsioni meteo disponibili al link: <https://tinyurl.com/previsioniARPAL>

Considerato che i valori raggiunti non sono più tali da contribuire al contenimento della mosca olearia, dalla prossima settimana non sarà più proposto l'approfondimento sull'andamento meteo, finalizzato a descrivere le condizioni in relazione alla possibilità di avvio e contenimento delle infestazioni.

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756

e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it



www.facebook.com/agriligurianet



Telegram: CAARserviziBot



Autorità di Gestione CSR Liguria



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Cofinanziato
dall'Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027—Intervento SRH06—“servizi di back office per l'AKIS”

GENOVA – bollettino n.20 del 24/09/2026



ANDAMENTO DEL CONTENUTO IN OLIO

Comune oliveto	Varietà	Quota	Sostanza grassa su fresco %	Sostanza grassa su secco %	Resa al frantoio prevista %
Bogliasco	Lavagnina/Pignola	80	16.11	34.56	10.63
Chiavari	Lavagnina	50	20.21	38.81	13.34
Chiavari	Lavagnina	65	19.16	37.6	12.65
Genova	Pignola	115	14.25	32.39	9.41
Genova	Miste	305	11.59	28.36	7.65
Lavagna	Lavagnina	70	18.1	36.8	11.95
Lavagna	Lavagnina	40	20.66	39.21	13.64
Leivi	Lavagnina	160	18.29	37.84	12.07
Leivi	Lavagnina	200	19.06	38.21	12.58
Mazzanego	Taggiasca	350	18.36	39.46	12.12
Ne	Miste	250	15.38	33.62	10.15
Santa Margherita Ligure	Pignola/Lavagnina	100	19.38	40.59	12.79
Sestri Levante	Lavagnina	120	19.15	39.01	12.64
MEDIA			17.67	36.65	11.66

Dati del 21/09/2026. I dati relativi all'intero territorio regionale sono disponibili al link: <https://tinyurl.com/inolizione2026>

Proseguono le **determinazioni del contenuto in olio** presso il **Laboratorio regionale di Sarzana**, condotte allo scopo di fornire indicazioni sullo stato di maturazione delle olive e utili per pianificare le raccolte. Nonostante le precipitazioni abbondanti che hanno ulteriormente favorito la buona idratazione delle drupe, **il contenuto medio in olio espresso sul peso fresco è risultato in linea a quello rilevato la scorsa settimana (media 17,7%, min 14,1%, max 19,1% e possibili rese al frantoio comprese tra 9,3% e 12,6%)**. I valori su fresco sono risultati mediamente superiori a quelli della stessa settimana del 2025 di circa 1,5 punti percentuali. **Il contenuto medio in olio espresso sul peso secco**, (valore non influenzato dall'idratazione delle olive e utile per valutare il progresso del processo di inolizione) **è risultato essere 36,6%, in aumento di quasi 1 punto rispetto alla settimana scorsa e superiore a quello della stessa settimana del 2025 di oltre 2 punti percentuali**.

E' opportuno ricordare che la maturazione delle olive e l'accumulo in olio dipendono da molti fattori (es. idratazione delle olive, varietà, microclima, tecnica di coltivazione, carica produttiva) per cui la variabilità tra un oliveto e l'altro può essere molto elevata, e che **la resa non è un parametro di qualità dell'olio**.

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR

Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756

e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it



www.facebook.com/agriligurianet



Telegram: CAARserviziBot



Autorità di Gestione CSR Liguria



GENOVA – bollettino n.20 del 24/09/2026



SITUAZIONE MOSCA

L'attività di ovideposizione è in aumento. Nelle aree evidenziate in rosso in tabella le **infestazioni attive risultano pari o superiori alla soglia di intervento (5-7%) e raggiungono talvolta valori elevati.**

Considerato l'andamento del contenuto in olio delle olive e visto che alcuni frantoi inizieranno le attività di molitura nella prima settimana di ottobre, è possibile **pianificare la raccolta anticipata delle olive** nella prima decade di ottobre, senza rischiare di compromettere la qualità dell'olio. In alternativa alla raccolta anticipata è possibile effettuare **tempestivamente un trattamento con prodotti ad azione larvicida.**

Negli areali evidenziati in grigio le infestazioni sono ulteriormente aumentate: si ribadisce che, **laddove non siano già stati eseguiti interventi**, per salvaguardare lo stato fitosanitario delle olive (e di conseguenza la qualità dell'olio) è **necessario ricorrere alla raccolta anticipata.**

Nelle aree evidenziate in giallo si **segnalano situazioni di allerta**, perché sebbene le infestazioni medie risultino inferiori alla soglia di intervento l'attività di ovideposizione è in corso e pertanto si invitano gli olivicoltori a prestare attenzione al prossimo comunicato o a verificare la situazione specifica del proprio oliveto, per valutare la necessità di eventuali trattamenti o pianificare al meglio la raccolta delle olive.

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE				
ZONE		0 - 100 m Inf. Attiva (%)	100 - 200 m Inf. Attiva (%)	200 - 350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	TRATTATO 17/09 o prossimo alla raccolta	TRATTATO 17/09 o prossimo alla raccolta	> 20% TRATTARE o PREVEDERE RACCOLTA ANTICIPATA
	PONENTE	8% TRATTARE o PREVEDERE RACCOLTA ANTICIPATA	TRATTATO 10/09	
 FASCIA 2 PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	6% TRATTARE o PREVEDERE RACCOLTA ANTICIPATA	ALLERTA media 2%	7% TRATTARE o PREVEDERE RACCOLTA ANTICIPATA
	PONENTE	TRATTATO 17/09 o prossimo alla raccolta	>20% TRATTARE o PREVEDERE RACCOLTA ANTICIPATA	ALLERTA media 3% MAX 11%
 FASCIA 3 ENTROTERRA	UNICA	TRATTATO 17/09 o prossimo alla raccolta		8% TRATTARE o PREVEDERE RACCOLTA ANTICIPATA

Dati rilevati in collaborazione con APOL S.C.A.R.L., Cooperativa Olivicoltori Sestresi e Cooperativa Agricola Lavagnina

Modalità di lettura dei dati disponibili nel comunicato n.7: <https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/>





GENOVA – bollettino n.20 del 24/09/2026



DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

PRODUZIONE INTEGRATA

Prodotti ad azione larvicida

È possibile utilizzare **flupyradifurone** (Sivanto Prime, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità, intervallo di sicurezza 14 giorni) oppure **acetamiprid** (per olive da olio: Kestrel i.s. 7 giorni o Epik SL i.s. 21 giorni; max 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità; per olive da mensa: Kestrel o Epik SL i.s. 28 giorni; max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità).

Per avere meno vincoli in fase di raccolta, si consiglia di prevedere l'impiego dei prodotti con intervallo di sicurezza più breve negli ultimi interventi, in relazione anche a possibili difficoltà organizzative dovute ad esempio a condizioni meteo avverse.

Relativamente all'impiego di tali prodotti, si ricorda che:

- * devono essere **impiegati sulle forme larvali giovani** e quindi tempestivamente non appena rilevato l'avvio delle infestazioni
- * è necessario **acidificare la soluzione** (pH 5,5)
- * si consiglia di impiegare la dose massima consentita da etichetta
- * prima della raccolta è necessario **rispettare l'intervallo di sicurezza riportato nell'etichetta del prodotto impiegato** e scartare il prodotto eventualmente caduto nelle reti prima che sia trascorso.

Esche proteiche

In questa fase non si consiglia più l'impiego di tecniche adulticide quali le esche proteiche.

In caso di infestazioni in corso procedere alla raccolta all'apertura dei frantoi.

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Raccolta anticipata delle olive

Si consiglia di prevedere la raccolta all'apertura dei frantoi, al fine di salvaguardare lo stato fitosanitario delle olive e la qualità dell'olio prodotto, possibilmente verificando la situazione specifica del proprio oliveto.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicata <https://bit.ly/RLmoscaolivo>

Maggiori informazioni sulla difesa dalla mosca in BIO <https://bit.ly/RLolivobio>

